

管理 No.207 【CPT-11 B 法】

2015 年 1 月 4 日作成

疾患名 : 大腸癌 1クール : 35 日(少なくとも 3 週休業) 総クール数 : 可能な限り

1. 薬剤

抗癌剤一般名	商品名	標準投与量	投与日	用量規制毒性
イリノテカン	イリノテカン塩酸塩 「タイホウ」	150 mg/m ²	Day1, 15	骨髄抑制(白血球減少) 下痢

2. レジメン

投与日	Rp	投与方法	投与時間	使用薬剤名	標準投与量	備考
Day1, 15	1	点滴静注	30 分	アロキシ(0.75mg/5mL)	1V	
				デカドロン(3.3mg/1mL)	3A	
				生食 50mL		
Day1, 15	2	点滴静注	120 分	イリノテカン塩酸塩「タイホウ」 (40 mg/2mL) (100 mg/5mL)	150 mg/m ²	直射日光を避けること
				生食 500mL		

3. 初回投与基準・次クール開始基準(2クール目以降、投与前日又は当日に下記条件を満たさない場合は延期する)

→「CPT-11 少量投与方法」を参照

4. 減量・中止基準 (前クール投与後に下記のいずれかに該当した場合は減量する)

- (1) Grade3 の血液毒性、あるいは Grade2 の下痢、排便回数の増加、腹痛が認められた場合には、副作用の回復を確認後、投与量を 80 mg/m²に減量して投与すること
- (2) その他「CPT-11 少量投与方法」を参照

5. 投与時の注意点

→「CPT-11 少量投与方法」を参照