

管理 No.403 【VNB 単独療法】

2015 年 1 月 4 日作成

疾患名 : 再発乳がん 1クール : 21 日 総クール数 : PDあるいはPS悪化まで

1. 薬剤

抗癌剤一般名	商品名	標準投与量	投与日	用量規制毒性
ビノレルビン	ロゼウス (ナベルビン)	25 mg/m ²	Day1,8	白血球減少・好中球減少

2. レジメン

投与日	Rp	ルート	投与時間	使用薬剤名	標準投与量	備考
Day1,8	1	点滴静注	5 分	生食 50ml		
Day1,8	2	点滴静注	5 分	生食 50ml ロゼウス(ナベルビン)	25 mg/m ²	
Day1,8	3	点滴静注	30 分	生食 250ml		

3. 初回投与基準

- (1) PS規定: PS 0、1、2
- (2) 白血球数 2000/mm³以上、好中球数 1000/mm³以上

4. 次クール開始基準 (2クール目以降、投与前日又は当日に下記条件を満たさない場合は延期する。)

- (1) PS規定: PS 0、1、2
- (2) 白血球数 2000/mm³以上、好中球数 1000/mm³以上

5. 減量・中止基準 (前クール投与後に下記のいずれかに該当した場合は減量する)

種類	最悪時の程度	次回投与量
血液毒性	白血球 1000/mm ³ 未満 血小板数 20000/mm ³ 未満 ³ 発熱性好中球減少症	第一段階 25 mg/m ² →20 mg/m ² 第二段階 20 mg/m ² →15 mg/m ² 以降は投与中止
非血液毒性(除、悪心・嘔吐、脱毛、食欲不振)	グレード3 以上	
末梢神経障害、筋肉痛、関節痛	グレード2 以上	